.39055/D

N. XVII

Vol 3
Vol. 4 (fasc. 10-11 only)
For complete copy see next vol.

B. 1. 3



HALL, BINDER, 33, GEORGE ST OXFORD.

FLORÆ DANICÆ
ICONUM
FASCICULUS DECIMUS.

MDCCLXXI.

NOMENCLATURA
ET
LOCI NATALES PLANTARUM,
quas Decimus hic Faſciculus exhibet.

Tab. DXLI.

Trifolium paluſtre. C. B. P. 327.
Menyanthes, trifoliata, *foliis ternatis.* Linn. S. N. 152. Hall. 632.
Locus. Vulgaris in ripis ac paludoſis.

Tab. DXLII.

Chelidonium majus vulgare. C. B. P. 144.
Chelidonium, majus, *pedunculis umbellatis.* Linn. S. N. 359. Hall. 1059.
Locus. Vulgaris in maceriis.

Tab. DXLIII.

Saponaria major lævis. C. B. P. 206.
Saponaria, officinalis, *calycibus cylindricis foliis ovato-lanceolatis.* Linn. S. N. 307. Fl. Fridrichsd. 352. Hall. 908.
Locus. In Holſatia, in ſolo pingui rarior.

Tab. DXLIV.

Potentilla. C. B P. 321.
Potentilla, Anſerina, *foliis pinnatis ſerratis, caule repente, pedunculis unifloris.* Linn. S. N. 350. Hall. 1126.
Locus. Paſſim in argilloſis.

Tab. DXLV.

Sambucus fructu in umbella nigro. C. B. P. 456.
Sambucus nigra, *cymis quinque-partitis*, *caule arboreo.* Linn. S. N. 219. Hall. 670.
Locus. Ubique in ſepibus.

Tab. DXLVI.

Groſſularia ſimplici acino vel ſpinoſa ſylveſtris. C. B. P. 455.
Ribes, uva criſpa, *ramis aculeatis, baccis glabris*, *pedicellis bractea monophylla.* Linn. S. N. 184. Hall. 820.
Locus. Paſſim in ſepibus.

Tab. DXLVII.

Barba capræ floribus compactis. C. B. P. 164.
Spiræa, Ulmaria, *foliis pinnatis*, *impari majore lobato*, *floribus cymoſis.* Linn. S. N. 374. Hall. 1135.
Locus. Ubique in pratis humidis.

Tab. DXLVIII.

Glaux maritima. C. B. P. 215. Linn. S. N. 188.
Locus. Paſſim in maritimis arenoſis.

Tab. DXLIX.

Anemone nemoroſa, *flore majore.* C. B. P. 176.
Anemone, nemoroſa, *ſeminibus acutis, foliolis inciſis, caule unifloro.* Linn. S. N. 375. Hall. 1154.
Locus. Ubique in lucis & ſylvis.

Tab. DL.

Braſſica campeſtris 1. Cluſ. Hiſt. 127.
Braſſica, campeſtris, *radice cauleque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis, ſeſſilibus.* Linn. S. N. 444. Hall. 457.
Locus. Paſſim in agris.

Tab. DLI.

Ranunculus pratenſis radice verticilli modo rotunda. C. B. P. 179.
Ranunculus, bulboſus, *calycibus retroflexis, pedunculis ſulcatis, caule erecto multifloro, foliis compoſitis.* Linn. S. N. 379. Hall. 1174.
Locus. Paſſim in pratis.

Tab. DLII.

Aparine major Plinii. Tabem. 788.
Aſperugo, procumbens, *calycibus fructus compreſſis.* Linn. S. N. 148. Hall. 606.
Locus. Rarior in cultis juxta ſepes.

Tab. DLIII.

Tilia fœmina folio minore. C. B. P. 426.
Tilia, europæa, *floribus nectario deſtitutis.* Linn. S. N. 363. Hall. 1030, C.
Locus. In lucis Inſularum Daniæ rarior.

Tab. DLIV.

Eryngium vulgare. C. B. P. 386.
Eryngium, campeſtre, *foliis radicalibus amplexicaulibus pinnato lanceolatis.* Linn. S. N. 202. Hall. 735.
Locus. In Holſatia. In montibus prope *Blankenaſſ.*

Tab. DLV.

Roſa ſylveſtris vulgaris flore odorato incarnato. C. B. P. 483.
Roſa, canina, *germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule petiolisque aculeatis.* Linn. S. N. 348. Hall. 1101.
Locus. Vulgaris in ſepibus.

Tab. DLVI.

Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro. C. B. P. 455.
Ribes, nigrum, *inerme, racemis piloſis, floribus oblongis.* Linn. S. N. 184. Hall. 810.
Locus. Paſſim in fruticetis.

Tab. DLVII.

Lepidium latifolium. C. B. P. 97.
Lepidium, *latifolium*, *foliis ovato-lanceolatis integris, ſerratis.* Linn. S. N. 433.
Locus. In littore orientali *Amagriæ* & alibi in argilloſis maritimis.

Tab. DLVIII.

Trifolium pratenſe luteum capitulo lupuli vel agrarium. C. B. P. 328.
Trifolium, agrarium, *ſpicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus nudis, caule erecto.* Linn. S. N. 503.
Locus. In paſcuis Daniæ minus rarum.

Tab. DLIX.

Lychnis viſcoſa, purpurea, latifolia, lævis. C. B. P. 205.
Silene, Armeria, *floribus faſciculatis, faſtigiatis, foliis ſuperioribus cordatis, glabris, petalis integris.* Linn. S. N. 311. Hall. 916. Gunn. Fl. Norv. 182.
Locus. In Ducatu Holſatiæ, ex. g. prope *Altonaviam* in collibus Albim verſus, item in agro *Nidroſienſi* Norvegiæ; ex hortis forte auſuga.

Tab.

Tab. DLX.

Eryſimum vulgare. C. B. P. 100.
Eryſimum, officinale, *ſiliquis ſpicæ adpreſſis*, *foliis runcinatis.* Linn. S. N. 441.
Locus. Paſſim in ruderatis & ad vias.

Tab. DLXI.

Plantago aquatica, *latifolia.* C. B. P. 190.
Aliſma, Plantago aquatica, *foliis ovatis acutis*, *fructibus obtuſe trigonis.* Linn. S. N. 257. Hall. 1184.
Locus. Ubique in ripis ac foſſis aquoſis.

Tab. DLXII.

Aſperula ſive Rubeola montana, *odora.* C. B. P. 334.
Aſperula, odorata, *foliis octonis lanceolatis*, *florum faſciculis pedunculatis.* Linn. S. N. 116. Hall. 728.
Locus. Vulgaris in ſylvis.

Tab. DLXIII.

Polygonum cocciferum. C. B. P. 281.
Scleranthus, perennis, *calycibus fructus clauſis.* Linn. S. N. 306. Hall. 1550.
Breyn monogr. Ledermul. microſc. p. 64. t. 32.
Locus. In agris arenoſis, apricis.

Tab. DLXIV.

Gramen caninum ſupinum minus. Scheuchz. gram. 128.
Agroſtis, ſtolonifera, *paniculæ ramulis patentibus muticis*, *culmo repente*, *calycibus æqualibus.* Linn. S. N. 90. Hall. 1473.
Locus. Paſſim in campis.

Tab. DLXV.

Epilobium, latifolium, *foliis alternis lanceolato-ovatis*, *floribus inæqualibus.* Linn. S. N. 264.
Locus. In Grœnlandia.

Tab. DLXVI.

Anemone, grœnlandica, *foliis ternatis ſerratis*, *ſcapo unifloro nudo.*
Locus. In Grœnlandia.

Tab. DLXVII.

Ledum, grœnlandicum, *ſtaminibus corolla brevioribus*, *foliis ellipticis.*
Anglorum *Labrador-The.*
Locus. In Grœnlandia.

Tab. DLXVIII.

Hyacinthus ſtellaris bifolius germanicus. C. B. P. 45.
Scilla, bifolia, *floribus erectiuſculis paucioribus.* Linn. S. N. 243. Hudſ. 123.
Locus. In inſulis *Færoæ*, unde miſit Chirurgus *Schröder.*

Tab. DLXIX.

Naſturtium alpinum tenuiſſime diviſum. C. B. P. 105.
Lepidium, alpinum, *foliis pinnatis integerrimis*, *ſcapo ſubradicato*, *ſiliculis lanceolatis*, *mucronatis.* Linn. S. N. 433. Hall. 516.
Locus. In Grœnlandia. Stirpes Grœnlandicas hanc 565. 566. 567. Chirurgus *Braſen* in patriam redux attulit.

Tab. DLXX.

Valeriana ſylveſtris. Dod. pempt. 349. S. Pauli Fl. 143. n. 131.
Valeriana, officinalis, *floribus triandris*, *foliis omnibus pinnatis.* Linn. S. N. 72. Hall. 210. Hill. monogr.
Locus. In ſylvis vulgaris.

Tab. DLXXI.

Ranunculus paluſtris apii folio lævis. C. B. P. 180.
Ranunculus, ſceleratus, *foliis inferioribus palmatis*, *ſummis digitatis*, *fructibus oblongis.* Linn. S. N. 379.
Locus. In ripis amnium paludumque vulgaris.

Tab. DLXXII.

Bugloſſum anguſtifolium majus. C. B. P. 256.
Anchuſa, officinalis, *foliis lanceolatis*, *ſpicis imbricatis ſecundis.* Linn. S. N. 145.
Locus. Paſſim in agris.

Tab. DLXXIII.

Coniza helenitis foliis laciniatis. Lob. ic. 347.
Cineraria, paluſtris, *floribus corymboſis*, *foliis lato-lanceolatis dentato-ſinuatis, caule villoſo.* Linn. S. N. 557.
Locus. Vulgaris in paludoſis.

Tab. DLXXIV.

Dens leonis latiore folio. C. B. P. 126.
Leontodon, Taraxacum, *calycis ſquamis inferne reflexis*, *foliis runcinatis denticulatis lævibus.* Linn. S. N. 521. Hall. 56.
Locus. Ubique.

Tab. DLXXV.

Ranunculus longifolius paluſtris minor. C. B. P. 180.
Ranunculus, flammula, *foliis ovato-lanceolatis petiolatis caule declinato.* Linn. S. N. 378. Hall. 1182.
Locus. Vulgaris in locis humidis.

Tab. DLXXVI.

Lychnis ſegetum major. C. B. P. 204.
Agroſtemma, Githago, *hirſuta calycibus corollam æquantibus*, *petalis integris nudis.* Linn. S. N. 319. Hall. 926.
Locus. Inter ſecale ubique.

Tab. DLXXVII.

Caryophyllus ſimplex ſupinus latifolius. C. B. P. 208.
Dianthus, deltoides, *floribus ſolitariis*, *ſquamis calycinis lanceolatis binis*, *corollis crenatis.* Linn. S. N. 308.
Locus. In collibus apricis Daniæ & Norvegiæ haud infrequens.

Tab. DLXXVIII.

Caryophyllus flore tenuiſſime diſſecto. C. B. P. 209.
Dianthus, ſuperbus, *floribus paniculatis*, *ſquamis calycinis brevibus acuminatis*, *corollis multifido-capillaribus*, *caule erecto.* Linn. S. N. 308. Hall. 898.
Locus. In Dania ac in Ducatibus in virgultis; copioſiſſime in inſula *Aunæ* Wordingborgenſi.

Tab. DLXXIX.

Bonus Henricus. Trag. 317. J. B. 2. 964.
Chenopodium, bonus Henricus, *foliis triangulari-ſagittatis integerrimis*, *ſpicis compoſitis aphyllis axillaribus.* Linn. S. N. 194. Hall. 1578.
Locus. Vulgaris in fimetis juxta villas.

Tab. DLXXX.

Mentha Cataria vulgaris & major. C. B. P. 228.
Nepeta, Cataria, *floribus ſpicatis*, *verticillis ſubpedicellatis*, *foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis.* Linn. S. N. 390.
Locus. In ruderatis.

Tab. DLXXXI.

Plantago latifolia incana. C. B. P. 189.
Plantago, media, *foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti.* Linn. S. N. 122.
Locus. Vulgaris in campis.

Tab. DLXXXII.

Balſamina lutea, ſive noli me tangere. C. B. P. 306.
Impatiens, noli tangere, *pedunculis multifloris ſolitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus.* Linn. S. N. 586. Hall. 557.
Locus. In ſylvis umbroſis & humidis.

Tab. DLXXXIII.

Echium ſcorpioides arvenſe. C. B. P. 254.
Myoſotis, ſcorpioides, *hirſuta ſeminibus nudis, foliorum apicibus calloſis.* Linn. S. N. 144. Hall. 590.
Locus. In paluſtribus magna corollis cæruleis, in aridis parva corollis luteis.

Tab. DLXXXIV.

Gramen Parnaſſi albo ſimplici flore. C. B. P. 309.
Parnaſſia, paluſtris. Linn. S. N. 221.
Locus. Vulgaris in pratis humidis.

Tab. DLXXXV.

Glaucium foliis radicalibus ſemipinnatis, caulinis amplexi-caulibus. Hall. 1060.
Chelidonium, Glaucium, *pedunculis unifloris, foliis amplexi-caulibus ſinuatis, caule glabro.* Linn. S. N. 360. Act. Dan. 5. p. 522.
Locus. In Jutlandia.

Tab. DLXXXVI.

Verbaſcum Lychnitis flore albo parvo. C. B. P. 240.
Verbaſcum, Lychnitis, *foliis cuneiformibus oblongis.* Linn. S. N. 169. Hall. 583. b. Fl. Fridrichsd. 184.
Locus. In macerie horti veteris agri Fridrichsdalenſis; ac in colle Palatii Plönenſis Holſatiæ.

Tab. DLXXXVII.

Sideritis Alſines trixaginis folio. C. B. prod. 111.
Stachys, arvenſis, *verticillis ſexfloris, foliis obtuſis nudiuſculis, corollis longitudine calycis, caule debili.* Linn. S. N. 395.
Locus. Paſſim in Dania & Ducatibus inter ſegetes.

Tab. DLXXXVIII.

Eupatorium veterum, ſive Agrimonia. C. B. P. 321.
Agrimonia, Eupatoria, *foliis caulinis pinnatis, impari petiolato, fructibus hiſpidis.* Linn. S.N. 329. Hall. 991.
Locus. Paſſim in virgultis.

Tab. DLXXXIX.

Tormentilla ſylveſtris. C. B. P. 326.
Tormentilla, erecta, *caule erectiuſculo, foliis ſeſſilibus.* Linn. S. N. 352. Hall. 1117.
Locus. In campis apricis vulgaris.

Tab. DXC.

Caryophyllus pratenſis flore laciniato ſimplici, ſive flos cuculi. C. B. P. 210.
Lychnis, flos cuculi, *petalis quadrifidis fructu ſubrotundo.* Linn. S. N. 319. Hall. 921.
Locus. In paſcuis humidis.

Tab. DXCI.

Fucus, granulatus, *fronde filiformi ramoſiſſima ramulis acuminatis, veſiculis ſubrotundis cumulatis ramis foliisque acutis omnibus innatis.* Linn. S. N. 917.
Locus. In Norvegiæ maritimis.

Tab. DXCII.

Tithymalus ſive Eſula exigua. C. B. P. 291.
Euphorbia, exigua, *umbella trifida, dichotoma, involucellis lanceolatis, foliis linearibus.* Linn. S. N. 332. Hall. 1048.
Locus. Inter ſegetes pagi *Sallerup* Præfecturæ Wordingborgenſis.

Tab. DXCIII.

Scordium. C. B. P. 247.
Teucrium, ſcordium, *foliis oblongis ſeſſilibus, dentato-ſerratis, floribus geminis, axillaribus pedunculatis, caule diffuſo.* Linn. S. N. 388. Hall. 288.
Locus. Rarius in umbroſis humidis; copioſe in palude *Eſkemoſe* prope *Kiöng*, Præfecturæ Wordingborgenſis.

Tab. DXCIV.

Lamium album non fœtens folio oblongo. C. B. P. 231.
Lamium, album, *foliis cordatis acuminatis, ſerratis petiolatis, verticillis viginti-floris.* Linn. S. N. 393. Hall. 271.
Locus. Ubique.

Tab. DXCV.

Tuſſilago vulgaris. C. B. P. 197.
Tuſſilago, farfara, *ſcapo unifloro imbricato, foliis ſubcordatis, angulatis, denticulatis.* Linn. S. N. 550. Hall. 143.
Locus. Vulgaris in ſolo argilloſo.

Tab. DXCVI.

Geranium batrachioides paluſtre, flore ſanguineo. Dill. Elth. t. 134. f. 161.
Geranium, paluſtre, *pedunculis bifloris longiſſimis declinatis, foliis quinque lobis inciſis, petalis integris.* Linn. S. N. 455. Hall. 933.
Locus. Copioſe in palude *Eſkemoſe* prope *Kiöng*, Præfecturæ Wordingborgenſis.

Tab. DXCVII.

1. *Lichenoides pullum ſuperne glabrum, inferne nigrum & cirrhoſum.* Dill. muſc. 226. t. 30. f. 130.
   Lichen, polyrrhizos, *umbilicatus, polyphyllus, utrinque lævis polyrrhizos.* Linn. S. N. 712. Enum. 268.
   Locus. In rupibus Norvegiæ & Islandiæ.
2. *Lichenoides puſtulatum cinereum & veluti ambuſtum.* Dill. muſc. 227. t. 30. f. 131.
   Lichen, puſtulatus, *umbilicatus, ſubtus lacunoſus, furfure nigro adſperſus.* Linn. S. N. 112. Enum. 264.

Locus. In rupibus Norvegiæ copioſe.

Tab. DXCVIII.

Lichenoides endiviæ foliis criſpis ſplendentibus ſubtus nigricantibus. Dill. muſc. t. 25. f. 96.
Lichen, glaucus, *foliaceus depreſſus lobatus glaber, margine criſpo farinaceo.* Linn. S. N. 711. Enum. 246.

F. 1. *tuberculoſus.*
2. *fimbriatus.*

Locus. In arboribus.

Tab. DXCIX.

Fungus gelatinoſus colore aurantio. Vaill. pariſ. t. 12. f. 8. 9.
Amanita glutinoſus flavus, pileo umbonato. Hall. 2420.
Locus. In graminoſis.

Tab. DC.

Agaricus caulescens albicans ſtipite longo annulato, pileo convexo viſcido. Linn. Fl. Sv. 1198? Enum. 873?
Locus. In graminoſis.

HAFNIÆ, typis CL. PHILIBERT.
Proſtat apud Autorem, & Bibliopolas Philibert & Heineck & Faber.

















Flora Danica Tab. DXLVIII.





Flora Danica Tab. DL.






Flora Danica Tab DLII.








Flora Danica Tab. DLV.







Flora Danica Tab. DLVIII.










Flora Danica Tab. DLXII.



Flora Danica Tab. DLXIII.



Flora Danica Tab. DLXIV





Flora Danica Tab. DLXVI.




Flora Danica Tab. DLXVII.




Flora Danica Tab. DLXVIII



Flora Danica Tab. DLXIX.









Flora Danica Tab. **DLXXIII.**










Flora Danica Tab. DLXXVII.





Flora Danica Tab. DLXXIX.





Flora Danica Tab. **DLXXXI.**





Flora Danica Tab. DLXXXIII.



Flora Danica Tab DLXXXIV.















Flora Danica Tab. DXCI.



Flora Danica Tab. **DXCII.**





Flora Danica Tab. DXCIV.



Flora Danica Tab. DXCV.



Flora Danica Tab. DXCVI.





1
2

1.



2.



Flora Danica Tab. DXCIX.



Flora Danica Tab. DC.



FLORÆ DANICÆ
ICONUM
FASCICULUS UNDECIMUS.

MDCCLXXV.

NOMENCLATURA
ET
LOCI NATALES PLANTARUM,
quas undecimus hic Faſciculus exhibet.

Tab. DCI.

Sedum majus vulgare. C. B. P. 283. Hall. 949.
Sempervivum tectorum, *foliis ciliatis, propaginibus patentibus.* Linn. S. N. 335.
Paſſim in tectis ceſpitoſis.

Tab. DCII.

Nymphæa alba major. C. B. P. 193.
Nymphæa alba, *foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido.* Linn. S. N. 361. Hall. 1067.
Paſſim in ſtagnis & rivis Daniæ & Norvegiæ.

Tab. DCIII.

Nymphæa lutea major. C. B. P. 193.
Nymphæa lutea, *foliis cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo, petalis majore.* Linn. S. N. 361. Hall. 1066.
Minus vulgaris in rivis & fluviis.

Tab. DCIV.

Juncus floridus major. C. B. P. 12.
Butomus umbellatus. Linn. S. N. 281. Hall. 1186.
Paſſim in piſcinis & rivis Daniæ.

Tab. DCV.

Fumaria bulboſa radice cava major. C. B. P. 143.
Fumaria bulboſa, *caule ſimplici, bracteis longitudine florum.* Linn. S. N. 469. Hall. 348.
Paſſim in lucis umbroſis.

Tab. DCVI.

Hieracium ſonchi folio, ſeu ſonchites. C. B. P. 126.
Sonchus arvenſis, *pedunculis calycibusque hiſpidis ſubumbellatis, foliis runcinatis, baſi cordatis.* Linn. S. N. 520. Hall. 23. & 111. p. 181.
Vulgaris in arvis humidis.

Tab. DCVII.

Solanum ſcandens, ſeu Dulcamara. C. P. B. 167.
Solanum Dulcamara, *caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis.* Linn. S. N. 173. Hall. 575.
Paſſim in ripis ac foſſis aquoſis.

Tab. DCVIII.

Geniſta ſpinoſa major longioribus aculeis. C. B. P. 394.
Ulex europæus, *foliis villoſis acutis, ſpinis ſparſis.* Linn. S. N. 476.
In maritimis apricis Inſulæ Sylt, & prope Altonaviam.

Tab. DCIX.

Rubia montana anguſtifolia. C. B. Prod. 145.
Galium glaucum, *foliis verticillatis linearibus, pedunculis dichotomis, caule lævi.* Linn. S. N. 118.
In Silveſtribus minus vulgaris.

Tab. DCX.

Trifolium hepaticum flore ſimplici. C. B. P. 330.
Anemone, Hepatica, *foliis trilobis integerrimis.* Linn. S. N. 374. Hall. 1156.
Frequens in Silveſtribus.

 Tab.

Tab. DCXI.

Pulſatilla flore minore nigricante. C. B. P. 177.
Anemone pratenſis *pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis.* Linn. S. N. 375. Flor. Fridrichsd. 439.
Frequens in campis apricis & arenoſis.

Tab. DCXII.

Ornithogalum anguſtifolium bulbiferum. C. B. P. 71.
Ornithogalum minimum *ſcapo angulato diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis.* Linn. S. N. 242.
In umbroſis raro.

Tab. DCXIII.

Conyza major flore globoſo. C. B. P. 266.
Inula Pulicaria, *foliis amplexicaulibus undulatis, caule proſtrato, floribus ſubgloboſis radio breviſſimo.* Linn. S. N. 558.
Juxta vias haud frequens.

Tab. DCXIV.

Glaux montana purpurea noſtras. Raj. Hiſt. 939.
Aſtragalus arenarius, *ſubcauleſcens procumbens; floribus ſubracemoſis erectis, foliis tomentoſis.* Linn. S. N. 499.
In munimento Havnienſi Amagriam ſpectante.

Tab. DCXV.

Tripolium majus, cæruleum. C. B. P. 267.
Aſter Tripolium, *foliis lanceolatis, integerrimis, carnoſis, glabris; ramis inæquatis; floribus corymboſis.* Linn. S. N. 554.
In maritimis.

Tab. DCXVI.

Phalangium parvo flore non ramoſum. C. B. P. 29. Hall. 1207.
Anthericum Liliago, *foliis planis, ſcapo ſimpliciſſimo, corollis planis, piſtillo declinato.* Linn. S. N. 244.
Inter Anth. *ramoſa* varietatem petalis minoribus, caule ſimplici, ſæpe reperi.

Tab. DCXVII.

Centaurium minus. C. B. P. 278.
Gentiana Centaurium, *corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, piſtillo ſimplici.* Linn. S. N. 200. Hall. 648.
Vulgaris in arvis.

Tab. DCXVIII.

Viola trachelii folio. Raj. Hiſt. 1051.
Viola hirta, *acaulis, foliis cordatis piloſo-hiſpidis.* Linn. S. N. 584. Hall. 559.
In fruticetis raro.

Tab. DCXIX.

Geniſta ſpinoſa anglica. C. B. P. 395. prodr. 157.
Geniſta anglica, *ſpinis ſimplicibus, ramis floriferis inermibus, foliis lanceolatis.* Linn. S. N. 475.
Vulgaris in ericetis Holſatiæ.

Tab. DCXX.

Juncus alpinus bombycinus. C. B. P. 12. prodr. 23.
Eriophorum alpinum, *culmis nudis triquetris, ſpica pappo breviore.* Linn. S. N. 84. Hall. 1333.
In paludibus alpinis.

Tab. DCXXI.

Carduus caule criſpo. J. B. Hiſt. 3. p. 59.
Carduus criſpus *foliis decurrentibus ſinuatis, margine ſpinoſis; floribus aggregatis terminalibus; ſquamis inermibus ſubariſtatis patulis.* Linn. S. N. 529. Hall. 72.
Ubique.

Tab. DCXXII.

Conyza major vulgaris. C. B. P. 265. Kyll. 30.
Conyza ſquarroſa, *foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboſo, calycibus ſquarroſis.* Linn. S. N. 547.
In Fionia & Holſatia.

Tab. DCXXIII.

Viola tricolor hortenſis repens, & flore purpureo & cæruleo. C. B. P. 199.
Viola tricolor, *caule triquetro diffuſo, foliis oblongis inciſis, ſtipulis pinnatifidis.* Linn. S. N. 185.
Paſſim juxta villas.

Tab. DCXXIV.

Alſine littoralis foliis Portulacæ. C. B. P. 251.
Arenaria peploides *foliis ovatis, acutis, carnoſis.* Linn. S. N. 313.
Paſſim in littoribus.

Tab. DCXXV.

Euphraſia pratenſis rubra. C. B. P. 234.
Euphraſia Odontites, *foliis linearibus: omnibus ſerratis.* Linn. S. N. 405.
In arvis haud infrequens.

Tab. DCXXVI.

Caryophyllus arvenſis glaber, flore majore C. B. P. 210.
Ceraſtium arvenſe, *foliis lineari-lanceolatis obtuſis, glabris; corollis calyce majoribus.* Linn. S. N. 320.
In arvis arenoſis.

Tab. DCXXVII.

Alſine triphyllos cærulea. C. B. P 250.
Veronica triphyllos, *floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus.* Linn. S. N. 58.
In ruderatis *Roeſkildæ* & *Sleſvigæ.*

Tab. DCXXVIII.

Verbena communis, flore cæruleo. C. B. P. 269.
Verbena officinalis, *tetrandra ſpicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule ſolitario.* Linn. S N. 63. Hall. 219.
Paſſim juxta vias & maceries in Dania.

Tab. DCXXIX.

Gramen hordeaceum minus & vulgare. C. B. P. 9. Scheuchz. 14.
Hordeum murinum, *floſculis lateralibus maſculis ariſtatis, involucris intermediis ciliatis.* Linn. S. N. 102.
Ubique in ruderatis.

Tab. DCXXX.

Gramen ſpicatum ſecalinum maritimum minus. Scheuchz 18.
Hordeum maritimum, *floſculis lateralibus ſpuriis ariſtatis, involucris ſcabris.*
In littore orientali Amagriæ.

Tab. DCXXXI.

Verbaſcum mas latifolium luteum. C. B P. 238.
Verbaſcum Thapſus, *foliis decurrentibus utrinque tomentoſis, caule ſimplici.* Linn. S. N. 169. Hall. 581.
Juxta maceries & in ruderatis.

Tab. DCXXXII.

Ulmus campeſtris & Theophraſti. C. B. P. 426.
Ulmus campeſtris, *foliis duplicato-ſerratis; baſi inæqualibus.* Linn. S. N. 198. Hall. 1586.
Ubique in Norvegia, in Dania rarior.

Tab. DCXXXIII.

Aſarum. C. B P. 197. Kylling. virid. 12.
Aſarum europæum, *foliis reniformibus obtuſis binis.* Linn. S. N. 325. Hall. 1547.
In Jutlandia.

Tab. DCXXXIV.

Meſpilus apii folio ſylveſtris ſpinoſa ſive Oxyacantha. C. B. P. 454. Hall. 1087.
Cratægus Oxyacantha, *foliis obtuſis ſubtrifidis ſerratis.* Linn. S. N. 342.
Paſſim in paſcuis Sylveſtribus.

Tab. DCXXXV.

Filipendula vulgaris. C. B. P. 163. Hall. 1136.
Spiræa Filipendula, *foliis pinnatis: foliolis uniformibus ſerratis, caule herbaceo, floribus cymoſis.* Linn. S. N. 347.
Vulgaris in pratis Daniæ.

Tab. DCXXXVI.

Quinquefolium paluſtre rubrum. C. B. P. 326.
Comarum paluſtre. Linn. S. N. 353.
Ubique in paludoſis.

Tab. DCXXXVII.

Lyſimachia cærulea galericulata ſive Gratiola cærulea. C. B. P. 246.
Scutellaria galericulata, *foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus.* Linn. S. N. 403.
Paſſim in ripa amnium & paludum.

Tab. DCXXXVIII.

Origanum ſylveſtre; Cunila bubula Plinii. C. B. P. 223.
Origanum vulgare, *ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus, ovatis* Linn. S. N. 399. Hall. 233.
Paſſim in dumetis apricis.

Tab. DCXXXIX.

Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis. C. B. P. 345 Hall. 422.
Ervum hirſutum, *pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis binis.* Linn. S. N. 488.
Paſſim inter ſegetes.

Tab. DCXL.

Hypericum Aſcylon dictum, caule quadrangulo. Bauh. hiſt. 3, 382.
Hypericum quadrangulum, *floribus trigynis, caule quadrato, herbaceo.* Linn. S. N. 510. Hall. 1038.
Juxta rivos & foſſas haud frequens.

Tab. DCXLI.

Elichryſum ſive Stæchas citrina latifolia. C. B. P. 264.
Gnaphalium arenarium, *herbaceum foliis lanceolatis: inferioribus obtuſis, corymbo compoſito, caulibus ſimpliciſſimis.* Linn. S. N. 544.
In collibus arenoſis paſſim.

Tab. DCXLII.

Lappa major montana capitulis tomentoſis, ſive Arctium Dioſcoridis. C. B. P. 198. Hall. 161, 2.
Arctium Lappa, *foliis cordatis inermibus petiolatis.* Linn. S. N. 528.
In Dania ubique.

Tab. DCXLIII.

Dracunculus pratenſis ſerrato folio. C. B. P. 98.
Achillea Ptarmica, *foliis lanceolatis, argute ſerratis.* Linn. S. N. 566.
Paſſim in umbroſis humidis.

Tab. DCXLIV.

Carduus in avena proveniens. C. B. P. 377. *Cirſium.* Hall. 171.
Serratula arvenſis, *foliis dentatis ſpinoſis.* Linn. S. N. 529.
Ubique in arvis.

Tab. DCXLV.

Typha paluſtris major. C. B. P. 20.
Typha latifolia, *foliis ſubenſiformibus, ſpica maſcula femineaque approximatis.* Linn. S. N. 614. Hall. 1305.
Paſſim in piſcinis.

Tab. DCXLVI.

Cyperoides ſpica pendula breviore, ſquamis e ſpadiceo vel fuſco rutilante viridibus. Scheuchz. 443; t. 10, f. 13.
Carex limoſa, *ſpicis ovatis pendulis: maſcula longiore erectiore, radice repente.* Linn. S. N. 618. Hall. 1392. Flora Fridrichsd. 764.
Paſſim in paludibus profundis.

Tab. DCXLVII.

Cyperoides veſicarium, ſpicis viridantibus vel ſubfuſcis. Scheuchz. 740 & 472.
Carex veſicaria, *ſpicis maſculis pluribus, femineis pedunculatis, capſulis inflatis, acuminatis.* Linn. S. N. 618. Hall. 1401.
Vulgaris in paludibus.

TAB. DCXLVIII.

1. *Muſcus capillaceus minimus calyptra villoſa.* Vaill. t. 27, f. 9. Hall. 1798. Enum. 1124.
Polytrichum arboreum, *ſubcauleſcens, capſula ventricoſa.*
In truncis fagineis.
2. *Muſcus foliis ſcutellatis, capitulo piriformi nutante.* Vaill. t. 26, f. 16. Dill. muſc. 407, t. 52, f. 75.
Mnium hygrometricum, *acaule, anthera nutante, calyptra reflexa, tetragona.* Linn. S. N. 700. Fl. Fridrichsd. 864. Enum. 996.
Vulgaris in foſſis humidis.
3. *Hypnum repens triangularibus reflexis foliis, minus.* Dill. 304, t. 39, f. 39.
Hypnum ſquarroſum, *ramis vagis, foliis ovatis apice ſubulatis undique reflexis.* Linn. Sp. pl. *non vero* S. N. *conf.* Fl. dan. t. 535, 1.
In Sylvis.

TAB. DCXLIX.

1. *Hypnum aquaticum flagellis & teretibus & pennatis.* Dill. 308. t. 40, f. 44.
Hypnum riparium, *ſurculis teretibus carnoſis, foliis acutis patulis diſtantibus.* Linn. S. N. 704. Enum. 994.
In humidis paſſim.
2. *Hypnum gracile ornithopodioides.* Dill. 320, t. 41, f. 55. Hall. 1749.
Hypnum Ornithopodioides, *ſurculis repentibus, ramis faſciculatis teretibus erectiuſculis, antheris erectis ovatis.* Hud. Fl. angl. 430. *minus vero* H. Ornithop. Linn.
Vulgaris in fago.

TAB. DCL.

Fucus flagelliformis, *fronde filiformi ſubdichotome ramoſa, flagellis teretibus longis.*
Rarus in Oceano Norvegico.

TAB. DCLI.

1. *Conferva trichodes, virgata, ſericea.* Dill. p. 31, t. 5, f. 33.
Conferva ſericea, *filamentis geniculatis ramoſis, ramis faſciculatis, confertis, viridibus.* Enum. 69.
In rivis haud frequens.
2. *Conferva fontinalis ramoſiſſima, glomeratim congeſta.* Dill p. 28, t. 5, f. 31.
Conferva glomerata, *filamentis geniculatis, ramulis brevioribus multifidis.* Linn. S. N. 721.
In ripa Fridrichsdalenſi.
3. *Conferva minima Byſſi facie.* Dill. p. 14, t. 2, f. 3.
Conferva fontinalis, *filamentis ſimpliciſſimis æqualibus, digito brevioribus.* Linn. S. N. 720. Fl. Fridrichsd. 1017.
Paſſim juxta ſcaturigines.

TAB. DCLII.

Fucus frondibus planis, palmatis. Ström. Söndm. 1. p. 91.
Fucus roſeus, *frondibus membranaceis repandis laciniatis petiolatis, caule tereti ſubramoſo. F. ſanguineo affinis.*
Paſſim in Sinu Chriſtianienſi Norvegiæ.

TAB. DCLIII.

Ulva incraſſata, *fronde ramoſa, ramis ſimpliciſſimis teretibus lubricis apicem verſus craſſioribus.*
In Sinu Laurvigenſi Norvegiæ.

TAB. DCLIV.

1. *Phallus* marcidus, *flavus, pilei margine inflexo, ſtipite flexuoſo, longiſſimo, baſin verſus attenuato.*
In apricis ſubalpinis Norvegiæ.
2. *Phallus* conicus *pileo campanulato fuſco, margine ſubſinuato ſtipite tereti fiſtuloſo, flavo.*
In arvo boreali Cronburgenſi.

TAB. DCLV.

1. *Trichia gregaria cinerea, petiolata, piriformis.* Hall. 2166.
In ramentis ſepium.
2. *Peziza* ſcabra *ſubfulva, intus lævis, nitida, extus granuloſa.*
In fimo equino.
3. *Merulius violaceus.* Hall. 2327.
In gramineis.

TAB. DCLVI.

1. *Fungoides ſcutellatum, interne album, externe obſcurum & ſubhirſutum.* Mich. t. 86 f. 4.
Peziza ſeſſilis hemiſphærica, extus villoſa, ſpadicea. Hall. 2231. Schœf. Fung. t. 151.
Paſſim in ambulacris ceſpitoſis.

2. *Fungoides coccineum minimum, oris non piloſis.* Michel. p. 207, 27.
In Sylveſtribus raro.

TAB. DCLVII.

1. *Coralloides lutea, non ramoſa, clava rugoſa.* Buxb. Cent. 4. p. 40, t. 66, f. 2.
Clavaria militaris, *clavata integerrima, capite ſquamoſo.* Linn. S. N. 725. N. A. Nat. curioſ. vol. 4. p. 215, t. 7, f. 5.
In gramineis ſylvarum e cadaveribus Inſectorum.

2. *Parva concha marina colore coccineo.* Sterb. fung. 112, t. 26. Mich. 206, 13.
Peziza cava albida intus coccinea. Hall. 2222. Schœf. Fung. t. 148.
In ambulacris arenoſis.

TAB. DCLVIII.

Elvela clavata. Schœff. fung. t. 149. *minus vero ſynonyma.*
Clavaria Spathula *capite compreſſo, dilatato, ſtipite rugoſo.*
Rariſſima in luco Fridrichsdalenſi.

TAB. DCLIX.

1. *Tubulifera* Cremor *hemiſphærica, lactiflua; mox brunnea, tubuloſa.*
In ſepimento abietino prati mei Hulvig Norvegiæ.

2. *Tubulifera* Ceratum, *tubuloſa, ceracea, fulva; mox nigra.*
In Sylva Dröbachienſi Norvegiæ.

TAB. DCLX.

1. *Conferva* ſtellaris, *filamentis e baſi orbiculari parallelis.*
In pariete vaſorum, ubi aqua ſtagnaverat.

2. *Ulva* granulata, *globoſa farcta viridis.* Linn. S. N. Mant. 136. *non vero* Spec. pl.
Conferva Piſum, *ſphærica filamentis concentricis.*
Ad margines ſtagnorum copioſe.

MONITUM.

Opus hoc vere regium a clariſſimo *Georgio Chriſtiano Oeder* hactenus elaboratum et editum, a me juſſu Regis auguſtiſſimi continuatum iri, faſciculorumque quemvis jam editorum aut in poſterum edendorum, nigrum quidem 2½. imperialium danicorum, coloratum vero 8 imper. pretio a me expetipoſſe, non ita pridem innotuit. E munificentia Imperantis æque ac ex improbo Botanici labore in ſtirpibus vaſtiſſimi a confinibus Albis ad Polum arcticum regionum tractus omni, qua accedi poſſunt, anni tempeſtate conquirendis, manifeſte pendet temporis intervallum, intra quod *Flora Danica*, quæ nec parem habet, nec facile habebit, ad finem perduci queat. Dimidium facti interea habemus; nihilque, quo eventus optatis clementiſſimi Principis ac publico deſiderio reſpondeat, intentatum relinqui, Botanophilis ſpondere audeo.

OTHO FRIDERICUS MÜLLER,
Regi Daniæ a Conſiliis Status.

HAFNIÆ, typis CL. PHILIBERT, A. 1775.

Proſtat apud Auctorem, & Bibliopolas PHILIBERT et HEINICKE & FABER.

❁ ❁ ❁



Flora Danica Tab. DCII.



Flora Danica Tab. DCIII.













Flora Danica Tab. DCIX.





Flora Danica Tab. DCX.





Flora Danica Tab: DCXI.















Flora Danica Tab. DCXVIII.



Flora Danica Tab. DCXIX.



Flora Danica Tab. DCXX.




Flora Danica Tab. DCXXI.






Flora Danica Tab. DCXXIII.







Flora Danica Tab. DCXXVI.




Flora Danica Tab. DCXXVII.












Flora Danica Tab. DCXXXII.



Flora Danica Tab. DCXXXIII.



Flora Danica Tab. DCXXXIV.








Flora Danica Tab. DCXXXVII.



Flora Danica Tab. DCXXXVIII.



Flora Danica Tab. DCXXXIX.



Flora Danica Tab. DCXL.




Flora Danica Tab. DCXLI.






Flora Danica Tab. DCXLIII






Flora Danica Tab. DCXLV.





Flora Danica Tab. DCXLVI






1.
2.
3.


1.
2.




Flora Danica Tab. DCLI.



Flora Danica Tab. DCLII.





Flora Danica Tab. DCLIV.



Flora Danica Tab. DCLV.




Flora Danica Tab. DCLVI.

1.



2.



Flora Danica Tab. DCLVII.

1.



2.



Flora Danica Tab. **DCLVIII.**



Flora Danica Tab. DCLIX.



Flora Danica Tab. DCLX.

1



2

